

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل

ویرایش این

تحقیق با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه
کنید.

موضوع:

احتمال اوتیسم و راه درمانی

تهیه و تنظیم:

استادگرامی:

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل

ویرایش این

تحقیق با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.

فهرست مطالب

- ۳.....بیماری اوتیسم چیست؟
- ۳.....کودک مبتلا به بیماری اوتیسم
- ۳.....تزریق واکسن باعث اوتیسم می شود؟
- ۴.....تعداد کودکان اوتیسمی چقدر است؟
- ۴.....ناتوانی های کودکان اوتیسمی کدامند؟
- ۵.....علائم بیماری اوتیسم چیست؟
- ۵.....کودکان اوتیسمی، ممکن است:
- ۵.....مشکلات ارتباطی این بیماران شامل:
- ۶.....تداخلات اجتماعی
- ۷.....بازی کردن به شیوه خود
- ۷.....رفتار نامناسب
- ۸.....نشانه ها و آزمایشات
- ۸.....درمان
- ۸.....- درمان جسمی
- ۹.....رژیم غذایی
- ۹.....کیس انتخابی کودک اوتیسم و یک نمونه آموزشی :
- ۹.....یک مثال آموزشی برای این کودک مبتلا به اوتیسم

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل

ویرایش این

تحقیق با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.

برای این آموزش‌ها به شرایط خاصی نیاز است؟..... ۱۰

منابع : ۱۰

بیماری اوتیسم چیست؟

اوتیسم، یک اختلال رشد است که در سه سال اول زندگی ظاهر می گردد. این بیماری با تاثیر بر روی مغز کودک، رفتارهای اجتماعی و مهارت ارتباط برقرار کردن را مختل می کند.

کودک مبتلا به بیماری اوتیسم

علت واقعی این بیماری هنوز مشخص نیست، اما مطالعاتی در رابطه با دلیل بروز این بیماری در حال انجام است. به نظر می رسد مساله ژنتیک مهم باشد. برای مثال دوقلوها بیشتر دچار این بیماری می شوند تا یک برادر و خواهر. اختلال کروموزومی و مشکلات عصبی در افراد اوتیسمی مشاهده شده است. دیگر علت های این بیماری (که هنوز به اثبات نرسیده) شامل: رژیم غذایی ، تغییرات مجرای گوارشی ، مسمومیت با جیوه ، عدم استفاده از ویتامین ها و املاح و حساسیت به واکسن است.

تزریق واکسن باعث اوتیسم می شود؟

بسیاری از والدین نگران این موضوع هستند که برخی واکسن ها برای کودک شان خطرآفرین است. دانشگاه امراض کودکان در آمریکا و موسسه دارویی (IOM) اعلام کردند که هیچ نوع واکسن و یا ترکیبات واکسنی مسئول ایجاد بیماری اوتیسم نیستند. آنها گفتند که فواید واکسن زدن خیلی بیشتر از خطرات احتمالی آن است.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل

ویرایش این

تحقیق با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.

تعداد کودکان اوتیسمی چقدر است؟

هنوز تعداد این کودکان، مشخص نشده است. بیماری اوتیسم در پسران ۳ تا ۴ برابر بیشتر از دختران است. وضعیت اقتصادی خانواده، میزان تحصیلات افراد خانواده و نوع زندگی تاثیری بر این بیماری ندارند.

ناتوانی های کودکان اوتیسمی کدامند؟

- ۱- سندرم Asperger : بیماری است که در طی سال های اول مدرسه ظاهر می گردد و شامل تداخلات اجتماعی، دقت زیاد در صحبت کردن و اشتیاق به کارهای غیرمعمول است.
- ۲- سندرم Rett : این یک بیماری سیستم عصبی است که برگشت را ایجاد می کند، به خصوص در استفاده از زبان و دست ها. تفاوت زیادی با اوتیسم دارد و تنها در زنان دیده شده است.
- ۳- ناتوانی در یادگیری : نادر است و این در مواردی رخ می دهد که به بچه یک چیز را یاد می دهیم و آن بچه در ۱۰ سالگی آن را از یاد می برد.
- ۴- ناتوانی در پیشرفت

همچنین اوتیسم می تواند تداخلاتی را در مغز ایجاد کند و بیماری های دیگری را نیز بوجود آورد از قبیل:

• Fragile X syndrome

• Mental retardation (عقب ماندگی ذهنی)

• Tuberos sclerosis (تصلب بافت ها)

• Seizures (صرع)

Fragile X syndrome یک بیماری ارثی می باشد که از کم هوشی ناشی می شود. در این بیماری ژن ها قادر نیستند پروتئین کافی را برای سلول (به خصوص سلول مغز) تولید کنند.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل

ویرایش این

تحقیق با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.

علائم بیماری اوتیسم چیست؟

بیشتر والدین اوتیسمی، هنگامی که بچه آنها ۱۸ ماهه تا ۲ ساله می شود، کمک می خواهند. بچه های اوتیسمی مشکلاتی دارند، از قبیل:

تداخل در روابط اجتماعی، وانمود کردن به بازی و ارتباط کلامی و غیر کلامی.

بیشتر کودکان اوتیسمی، در سن ۱ یا ۲ سالگی معمولی هستند، ولی ناگهان زبان گفتاری و مهارت های اجتماعی را از دست می دهند.

کودکان اوتیسمی، ممکن است:

- بسیار حساس به نور، صدا، لمس، بو و یا مزه باشند. مثلا از پوشیدن لباس های زبر خودداری کنند و ناراحت و افسرده شوند.

- هنگامی که زندگی روزانه تغییر پیدا کند، حرکات تکراری را انجام دهند و یا اشیا را در جای خود نگذارند. همه این عوامل باعث اندوه و پریشانی آنها می شود.

این نشانه ها ممکن است از ضعیف تا شدید باشد.

مشکلات ارتباطی این بیماران شامل:

- نمی توانند صحبت را شروع کنند، و یا توانایی ادامه بحث را ندارند.

- ارتباط، با حرکات دست به جای استفاده از لغات صورت می گیرد.

- رشد زبان و تکلم به کندی صورت می گیرد و یا اصلا صورت نمی گیرد.

- عدم دقت در دیدن اشیا

- به جای لغت "من" از "تو" استفاده می کند، برای مثال به جای آن که بگوید من آب می خواهم، می گوید "تو آب می خواهی.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل

ویرایش این

تحقیق با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه

کنید.

- عدم توجه به اشیا (در ۱۴ ماهگی مشخص می شود)

- کلمات و یا جملات را تکرار می کنند.

- بدون احساس حرف می زنند.

تداخلات اجتماعی

روابط دوستانه ندارند.

بازی های کلامی را دوست ندارند.

تنهایی را ترجیح می دهند.

بدون توجه به لبخند هستند.

عدم پاسخ به اطلاعات احساسی

از صدای بلند، وحشت زده نمی شوند.

حواس بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه کمی دارند.

ممکن است از صدای معمولی، خوش شان نیاید و دستان شان را بر گوش خود بگذارند.

ممکن است تنها بمانند، زیرا خیلی دست پاچه می شوند.

یک سطح صاف را خارش می دهند و اشیا را لیس می زنند.

به درد، خیلی زیاد و یا خیلی کم واکنش نشان می دهند.

ممکن است یک جمله را چندین بار تکرار کنند.

منظور گوینده را به سختی می فهمند.

نمی توانند درک کنند که گوینده حرف خنده دار می زند و یا سرزنش کننده.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل

ویرایش این

تحقیق با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.

ممکن است حرف نزنند و یا خیلی کم حرف بزنند.

خطر را حس نمی کنند.

بازی کردن به شیوه خود

یک تکه کوچک اسباب بازی برای آنها جالب می باشد، مثلا چرخ های یک ماشین.

بازی کسی را تقلید نمی کنند.

ترجیح می دهند تنها بازی کنند.

در آن نقش که بازی می کنند، دارای قوه تخیل کمی هستند.

همیشه باید یک بازی کنند.

آن ها رفتار مخصوص به خود دارند. خود را یا تکان می دهند و یا دست می زنند.

رفتار نامناسب

خشونت

تکرار یک نقش یا فکر

بی دقت

بی علاقه و بدون احساس

پرتحرک و یا کم تحرک

تمایل به خود و یا دیگران

تکرار حرکات بدن

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل

ویرایش این

تحقیق با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.

نشانه ها و آزمایشات

اگر نوزاد شما دچار مشکلات زیر بود، حتما او را نزد پزشک ببرید:

در ۱۲ ماهگی، هنوز چیزی نمی گوید (منظور گفتن همان کلمات ناواضح است)

در ۱۲ ماهگی، اشاره نمی کند و یا "بای بای" نمی کند.

در ۱۶ ماهگی، یک لغت هم نمی گوید.

در ۲۴ ماهگی، دو لغت نمی گوید.

از دست دادن تکلم و یا مهارت های اجتماعی در هر سنی

درمان

- دارو درمانی: دارو برای جلوگیری از خشم، عصبانیت، مشکلات حواس، بیش فعالی، مشکلات خوب، بی پروا بودن، زودرنج بودن و زود عصبانی شدن، به کار می رود.

- تجزیه رفتار کاربردی (ABA): برای تقویت مهارت های مختلف کاربرد دارد. این برنامه در منزل کودک صورت می گیرد.

- درمان و تدریس به کودک اوتیسمی (TEACH): در این روش به کودک با استفاده از عکس ها نشان می دهند که چه کارها و مهارت هایی را باید انجام دهد.

- درمان جسمی

- صحبت درمانی: در این روش با کودک خیلی واضح و روشن حرف می زنند. ممکن است ساعت ها طول بکشد تا بتوان یک جمله را به کودک یاد داد.

- معالجه حسی و بینایی

بهترین درمان، مجموع تمامی درمان های بالا می باشد.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل

ویرایش این

تحقیق با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.

رژیم غذایی

برخی از بچه های اوتیسمی، مایل به رژیم فاقد گلوتن و یا فاقد کازئین می باشند. گلوتن در گندم، جو و چاودار است. کازئین در شیر، پنیر و دیگر محصولات لبنی یافت می شود.

هیچ بررسی نشان نداده است که تغییر رژیم غذایی، اثر مثبتی بر روی این کودکان داشته باشد.

اما کودک باید یک رژیم متعادل داشته باشد و به مقدار کافی انرژی و مواد مغذی دریافت کند.

کیس انتخابی کودک اوتیسم و یک نمونه آموزشی :

در سراسر دنیا هیچ درمان قطعی دارویی برای آن وجود ندارد و داروهای مورد استفاده هم فقط برای کاهش علائم اوتیسم کاربرد دارند، نه درمان بیماری.

- زیاد هم نباید نا امید بود، امروزه روشی وجود دارد تحت عنوان روش aba یا تحلیل رفتار کاربردی. این روش که از جمله علمی ترین روش های موجود در این زمینه است به صورت آهسته و گام به گام آموزش هایی به کودکان مبتلا به اوتیسم ارائه می دهد. در این روش درمانگر هدف یا همان آموزش نهایی را به زیر مجموعه هایی تقسیم می کنیم و بعد از آموزش کامل هر مرحله به سراغ آموزش بعدی می رویم تا در نهایت به آموزش نهایی برسیم.

یک مثال آموزشی برای این کودک مبتلا به اوتیسم

- مثلا وقتی می خواهیم شلوار پوشیدن را به یک کودک مبتلا به اوتیسم آموزش بدهیم، در مرحله اول شلوار را تا بالای زانوی او بالا می کشیم و از او می خواهیم بقیه کار را خودش انجام دهد، وقتی در این کار موفق شد در مرحله بعد شلوار را تا زانو بالا می کشیم و از او می خواهیم خم شود و شلوار را بالا بکشد. همین طور مرحله به مرحله جلو می رویم. از او می خواهیم شلوار را از میچ پای خود بالا بکشد، شلوار را آماده می کنیم و به دست او می دهیم. تمام این مراحل به آرامی و با صبر و حوصله انجام می شود.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل

ویرایش این

تحقیق با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه

کنید.

برای این آموزش‌ها به شرایط خاصی نیاز است؟

- بله، آموزش باید به صورت نفر به نفر (به ازای هر کودک یک مربی) انجام شود. ساعات کار و آموزش به این بچه‌ها در طول روز براساس آنچه در آمریکا انجام می‌شود، ۳ ساعت است. آموزش‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق و مناسب انجام شود و در حدود دو تا سه سال به صورت انفرادی و بعد از آن گروهی باشد. والدین باید به شکل موثر با مربی همکاری داشته باشند و آموزش‌ها را یاد بگیرند، البته آنها مجاز نیستند خودشان به‌طور مستقیم به کودک آموزش دهند بلکه باید رفتارهای آموخته شده از سوی مربی را از آنها بخواهند. این بچه را باید حتی‌الامکان وارد گروه کودکان عادی کرد و حتی به مدارس عادی فرستاد. رفتارهای مناسب آنها را باید با تشویق در آنها تثبیت کرد، از جمله دادن خوراکی، نوازش، گفتن آفرین و....

منابع :

www.sid.ir